


VÊLAGE 911

GESTION DU COLOSTRUM



SAVOIR QUAND AGIR

- Jumeaux
- Veaux faibles
- Mauvais réflexe de têtée
- Vêlages difficiles
- Mauvaise santé du pis
- Manque d'instinct maternel

FAIRE

- ✓ Veillez à ce que la vaccination du troupeau soit à jour.
- ✓ Intervenez tôt. L'apport idéal est de 2 litres de colostrum dans les 2 premières heures après la naissance et un autre 2 litres dans les 8 à 12 heures suivantes.
- ✓ Donnez-en suffisamment. Les veaux ont besoin d'un minimum de 100 g d'IgG lors de leur première alimentation. Veillez à ce que le produit de remplacement d'IgG totalise 100 g, ce qui peut requérir plus d'un paquet.
- ✓ Collecter le colostrum de votre troupeau. Le colostrum frais ou congelé provenant de votre ferme constitue toujours la meilleure solution.

NE PAS FAIRE

- ✗ Ne donnez pas le mauvais produit. Le produit de remplacement est destiné à être utilisé lorsqu'aucune autre source de colostrum n'est disponible et doit contenir des niveaux adéquats d'IgG. Les suppléments sont destinés à être ajoutés à l'alimentation d'un veau qui a déjà reçu du colostrum.
- ✗ Ne procédez pas automatiquement à l'alimentation par sonde. Il est toujours préférable d'essayer d'abord l'alimentation par tétine, et en cas d'échec, de passer à l'alimentation par sonde. L'alimentation par sonde place le liquide directement dans le rumen, ce qui ne permet pas une absorption maximale des IgG et des nutriments.
- ✗ Ne décongelez jamais le colostrum au micro-ondes, faites le plutôt au bain marie chaud.
- ✗ Ne donnez pas de colostrum provenant d'une autre ferme. L'utilisation de colostrum cru provenant d'autres fermes est susceptible d'introduire des maladies non présentes dans votre ferme.

