

# Optez pour les suivis de troupeau planifiés, moins de stress et de meilleurs résultats!

Effectuer des visites planifiées de médecine préventive avec son médecin vétérinaire, c'est optimiser la santé, le bien-être et la rentabilité de sa ferme par l'entremise d'une approche sanitaire globale.

Bien que le suivi de la reproduction y soit un incontournable, d'autres aspects complémentaires pourront être intégrés tels :

- Gestion de la santé mammaire
- Suivi des problèmes locomoteurs
- Suivi de la production et gestion des maladies d'origine nutritionnelle
- Optimisation de la santé et croissance des animaux de remplacement
- Surveillance des maladies infectieuses et biosécurité
- Optimisation du bien-être et procédures de soins
- Etc.

**Performance,  
tranquillité...**



**Vous définissez vos  
objectifs et nous nous  
engageons à vous  
aider à les atteindre !**



**SUIVRE LA REPRODUCTION DE  
MON TROUPEAU AVEC MON  
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE,  
J'Y GAGNE!**

1925, rue Girouard Ouest  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A5  
amvpq@amvpq.org  
1 450 771-7710



Association des  
Médecins Vétérinaires  
Praticiens du Québec

AMVPQ.ORG




Association des  
Médecins Vétérinaires  
Praticiens du Québec

AMVPQ.ORG



Une bonne gestion de la reproduction de votre troupeau s'avère essentielle à la vitalité économique de votre entreprise.

Optimiser la reproduction de votre troupeau tout en tenant compte de votre situation, de vos objectifs et de vos habitudes fait partie intégrante de notre travail. Plusieurs options et stratégies sont actuellement disponibles afin de surveiller les pathologies et d'améliorer la fertilité de votre troupeau.



Une des composantes clés de performance en reproduction est la détection rapide et continue des vaches non gestantes.

Or, de plus en plus, différentes méthodes diagnostiques de la gestation s'offrent à vous.

## LE DIAGNOSTIC DU STATUT DE GESTATION CHEZ LA VACHE LAITIÈRE

Afin de faire le point sur vos stratégies de régie de la reproduction, n'hésitez pas à consulter le tableau qui suit et à en discuter avec votre médecin vétérinaire praticien.

### PORTRAIT SUR LES MÉTHODES ACCESSIBLES

|                                                                                                                                                      | Détection indirecte en laboratoire<br>(protéine en lien avec gestation) |                 | Détection directe<br>transrectale par le médecin vétérinaire |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                      | ANALYSE DE SANG                                                         | ANALYSE DE LAIT | PALPATION MANUELLE                                           | ÉCHOGRAPHIE                     |
| Réalisable à partir de :                                                                                                                             | 28-29 JDS                                                               | 28 JDS          | 32-40 JDS selon objectifs                                    | 29 JDS ou moins selon objectifs |
| Confirmation recommandée                                                                                                                             | oui                                                                     | oui             | oui                                                          | oui                             |
| Examen des ovaires incluant un plan d'actions approprié selon les structures liées au cycle ou le dépistage de pathologies (anoestrus, kystes, etc.) | non                                                                     | non             | oui                                                          | oui (très précis)               |
| Examen de l'utérus incluant un plan d'actions approprié advenant le dépistage de pathologies (métrite, pyomètre, etc.)                               | non                                                                     | non             | oui                                                          | oui (très précis)               |
| Visualisation de la vitalité de l'embryon ou du fœtus                                                                                                | non                                                                     | non             | non                                                          | oui (à partir de 30 JDS)        |
| Détection des jumeaux ou triplets                                                                                                                    | non                                                                     | non             | non                                                          | oui (à partir de 30 JDS)        |
| Sexage du fœtus                                                                                                                                      | non                                                                     | non             | non                                                          | oui (entre 55 et 85 JDS)        |
| Importance de fournir la bonne date de saillie                                                                                                       | élevée                                                                  | élevée          | modérée                                                      | modérée                         |
| Temps et main-d'œuvre requis                                                                                                                         | modéré                                                                  | faible          | modéré                                                       | modéré                          |
| Nécessité de contention des animaux                                                                                                                  | modérée                                                                 | faible          | modérée                                                      | modérée                         |
| Stade de lactation requis                                                                                                                            | oui<br>≥ 60-90 JEL                                                      | oui<br>≥ 60 JEL | aucun                                                        | aucun                           |
| Réalisable chez les animaux hors lactation (taures...)                                                                                               | oui                                                                     | non             | oui                                                          | oui                             |